

Réaliser un diagnostic :

- En menant l'anamnèse du patient, antécédents médico-chirurgicaux, circonstances et heure de survenue du traumatisme, la notion de perte de connaissance
- En réalisant un examen clinique à la recherche d'œdème, de plaie muqueuse et/ou cutanée, d'hématome, d'asymétrie faciale, de troubles visuels (diplopie), de fracture maxillaire et/ mandibulaire (trouble de l'occlusion, hypoesthésie infra-orbitaire, labio-mentonnière), ATM, fracture et/ou mobilité dentaire, perte dentaire,
- En prescrivant les examens d'imagerie complémentaire : cliché rétro-alvéolaire, radiographie panoramique, Cone Beam Computed Tomography, une tomodensitométrie du massif facial pour rechercher les fractures dentaires et/ou osseuses,
- En s'assurant de la couverture vaccinale anti-tétanique.

Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique :

- En demandant un avis à un chirurgien maxillo-facial ou ORL en cas de fracture des os propres du nez, fracture de Lefort 2 et 3, fracture du plancher de l'orbite, fracture du zygoma,
- En évaluant le temps extra-oral en cas d'expulsion dentaire (décision de réimplantation ou non,
- En demandant un avis ophtalmologique, neurochirurgical ou ORL en fonction des traumatismes associés.

Réaliser l'intervention chirurgicale :

- En réalisant un parage et explorations des plaies,
- En traitant les subluxations ou luxations dentaires par repositionnement ou réimplantation pour les dents définitives,
- En réalisant un traitement fonctionnel pour les fractures unifocales non déplacées,
- En réalisant une contention dentaire, une réduction des fractures dento-alvéolaires et/ou maxillaire,
- En réalisant un blocage intermaxillaire, une ostéosynthèse par mini-plaques pour les fractures déplacées

Effectuer un suivi post-opératoire immédiat :

- En prescrivant des traitements antalgiques adaptés +/- antibiotiques, antiseptiques oraux et des soins locaux,
- En effectuant les contrôles d'imagerie nécessaires,
- En donnant des conseils hygiéno-diététiques,
- En réalisant un certificat médical initial.

Effectuer un suivi en temps différé :

- Réalisant le suivi dentaire à distance (recherche d'ankylose, de résorption, de sensibilité, de nécrose),
 - En contrôlant la cicatrisation muqueuse et/ou cutanée,
 - En contrôlant la consolidation des fractures osseuses,
- En contrôlant l'occlusion.